

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*



Abb. 1: ♂ im Brutkleid. 27. 07. Zwei getrennte Augenflecken.

Abb. 2: ♂ Im Brutkleid. 01.07. Bei älteren Männchen können die Augenflecken zusammenfließen wie bei ssp. *iberiae*.



Abb. 3: ♂ fütternd. 03.07.


Die hier gezeigten skandinavischen Individuen sind etwas dunkler als die braungrauen zentraleuropäischen Vögel. Der kleine weiße Keilfleck an den Basen der Handschwinge ist auf der Abb.1 zu sehen, kann aber - wie auf Abb. 3 gezeigt - fehlen.



© Hubert Schaller

Abb. 4: ♀ im Brutkleid während der Aufzuchtphase. 11.07.

Abb. 5: Ästling mit männlichem Altvogel. 03.07. Der übersättigte Jungvogel lehnt das überreichliche Futterangebot ab. Er zeigt schon die diagnostischen weißen Schwanzkanten.



© Hubert Schaller



Abb. 6: Läufing, er wird noch am Boden gefüttert. 03.07.

Abb. 7: Ein männlicher Hybride von Trauer- und Halsbandschnäpper wurde dokumentiert im OAG Ufr.2 Jahrbuch 2015. S. 106. R. Jahn, A. Wöber.

Das weiße Halsband ist unterbrochen, der große weiße Stirnfleck ist nicht zweigeteilt. Der weiße Keilfleck des Halsbandschnäppers fehlt.



© Rainer Jahn